INVITRO

ООО «ИНВИТРО», 125047, г. Москва
ул. 4-ая Тверская-Ямская, д. 16, корп. 3
+7 (800) 200 363 0, +7 (495) 363 0 363, www.invitro.ru

Заполнять только печатными буквами!

Заказчик

Пациент

Дата рождения / / (число, месяц, год) Пол м ж Номер полиса Номер ДК

Заказчик

Заказчик

Тел./моб.: sms: Штрих-код:

e-mail: Кодовое слово:

Диагноз:

Принимаемые препараты:

ФИО врача

Предупрежден(а) о правилах подготовки перед взятием и(или) приёмом биоматериала.

Пробирка (и) промаркирована (ы) в моём присутствии.

С данными бланка ознакомлен (а), претензий не имею.

Подпись/расшифровка

/ / (число, месяц, год)

Комплекс тестов «ГАСТРОПАНЕЛЬ»

Комплекс тестов (разработка финской компании BIOHIT), позволяющих выявить наличие Helicobacter pylori- ассоциированного гастрита, определить локализацию патологического процесса в желудке и оценить характер изменений. Программная обработка данных (GastroSoft, BIOHIT) позволяет предоставить наиболее вероятную интерпретацию результатов, предполагаемый диагноз, расчёт рисков и рекомендации.

Заполняется пациентом (нужное подчеркнуть)

Эрадикация H. pylori – стандартное лечение, направленное на полное уничтожение H. pylori с использованием антибиотиков и др.):

> 1 года назад < 1 года назад не было неизвестно

Использование препаратов ИПП (ингибиторы протонной помпы, например, лансопразол, омепразол, пантопразол, эзомепразол, рабепразол и др.):

часто иногда нет неизвестно

Симптомы повышенной кислотности (кислый привкус во рту, отрыжка, изжога, несварение желудка):

часто нет неизвестно

Использование НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты, например, аспирин, ибупрофен, диклофенак, индометацин и др.)

часто нет неизвестно

ГАСТР	**Гастропанель** антитела к Helicobacter pylori, IgG, пепсиноген I, пепсиноген II, соотношение пепсиногенов I/II, гастрин-17 базальный (натощак)	343 ● ⊗ ❄ 343 ● ⊗ ❄
978	**Стимуляционная проба*** гастрин-17 стимулированный * (после приема белкового завтрака)	344 ● ⊗ ❄ 344 ● ⊗ ❄

Специальные обозначения:

343 – номер контейнера ● – пробирка с красной крышкой с гелем ⊗ – центрифугировать 10 мин. 2000g ❄ – заморозить (-17..-23°C) в вертикальном положении

*Стимуляционная проба позволяет дифференцировать пациентов с атрофическим гастритом антрального отдела от пациентов с низким базальным уровнем гастрина-17 (<1 пмоль/л натощак), связанным с высокой кислотностью.

Аллергических реакций на сою, молочные продукты, яйца, шоколад не наблюдалось (эти компоненты могут входить в состав белкового напитка, применяющегося для стимуляционной пробы).
Настоящим подтверждаю, что с правилами преаналитики перед проведением теста ознакомлен(а), мне разъяснено, что несоблюдение указанных правил может повлиять на результаты исследования.

ФИО _____ / _____ дата «_____» _____ 20____ г.
подпись

бланк действует с 01.02.2017