

ФИО

Пол: **Жен**
Дата рождения: **27.06.1980**
Возраст: **45 лет**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 08.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 08.10.2025 11:54
Врач: 08.10.2025 16:23
Дата печати результата: 08.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
АТ к белку BP180, IgG	10.00	ед/мл	<20

Исполнитель Пешкова Н.Г., врач клинической лабораторной диагностики

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол:	Жен
Дата рождения:	27.06.1980
Возраст:	45 лет
ИНЗ:	999999999
Дата взятия образца:	08.10.2025 07:00
Дата поступления образца:	08.10.2025 11:54
Врач:	08.10.2025 16:23
Дата печати результата:	08.10.2025

Исследование

Комментарий к результату исследования

Отсутствие антител к белку BP180 значительно снижает вероятность диагноза буллезного пемфигоида, однако не исключает наличие другой клинической формы буллезного дерматоза или близкого аутоиммунного заболевания. Основной причиной пемфигоида является образование антител против структурных белков гемидесмосом базальных слоев эпидермиса кожи – BP180 и BP230. Эти белки входят в состав гемидесмосом, обеспечивающих прикрепление клеток базального слоя эпидермиса к базальной мембране. Клиническая чувствительность обследования аутоантител к BP280 составляет 54 %, а при одновременном определении с антителами к BP230 она повышается до 88%. Окончательный диагноз подтверждается с помощью биопсии и гистологического исследования ткани.

Исполнитель Пешкова Н.Г., врач клинической лабораторной диагностики

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача