

ФИО

Пол:Жен

Возраст:64 года

ИНЗ:999999999

Дата взятия образца:03.01.2026 08:56

Дата поступления образца:05.01.2026 08:02

Врач:08.01.2026 15:44

Дата печати результата:09.01.2026

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Белок Бенс-Джонса, типирование суточной мочи				
Альбумин в моче	13.9	%	не обнар	
Белок Бенс-Джонса, экскреция	0.81*	г/сут	не обнаруж.	
Общий белок мочи, экскреция	1.258*	г/сут	<0.15	
Исполнитель Пешкова Н.Г., врач клинической лабораторной диагностики				

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Комментарии к заявке:
Диурез 2700 мл

Динамику результатов исследований, выполненных в лаборатории ИНВИТРО, можно посмотреть в Личном кабинете.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол:	Жен
Возраст:	64 года
ИНЗ:	999999999
Дата взятия образца:	03.01.2026 08:56
Дата поступления образца:	05.01.2026 08:02
Врач:	08.01.2026 15:44
Дата печати результата:	09.01.2026

Исследование

Заключение

При иммунофиксации в образце мочи обнаружен парапротеин (Белок Бенс-Джонса и/или моноклональные иммуноглобулины), представленный свободными легкими цепями каппа, содержание 0,81 г/сут. Выявление Белка Бенс-Джонса в моче указывает на высокую вероятность наличия (серьезных) онкогематологических заболеваний, таких как множественная миелома (особенно "болезнь лёгких цепей"), MGUS, AL амилоидоз, макроглобулинемия Вальденстрёма, В-клеточная неходжскинская лимфома, В-клеточная лейкемия. Выявление Белка Бенс-Джонса в моче, учитывается при оценки тяжести течения заболевания. Может быть рекомендовано проведение иммунофиксации сыворотки крови для выявления/исключения наличия парапротеина. Выявлена протеинурия, не связанная с присутствием белка Бенс-Джонса. Она может быть обусловлена чрезмерным выведением иных белков (например, альбумина и др.), не относящихся к парапротеинам. Данная протеинурия в сочетании с белком Бенс-Джонса может свидетельствовать о поражении мочевыделительной системы. При онкогематологических заболеваниях поражение почек, вызванное белком Бенс-Джонса, часто сопровождается другим типом протеинурии.

Исполнитель Пешкова Н.Г., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:

Диурез 2700 мл

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача