

# SteatoScreen


Ф.И.О. :

## Демографические данные

Пол \_\_\_\_\_  
Дата рождения \_\_\_\_\_

## Анализы

Дата сдачи анализов	31/05/2009
Основные клинические данные	Неизвестно
Альфа2 Макроглобулин (г/л)	1.67
Гаптоглобин (г/л)	0.84
Аполипопротеин А1 (г/л)	1.25
Билирубин (мкмоль/л)	7.90
Гамма ГТ (МЕ/л)	21
АЛТ (МЕ/л)	17
АСТ (МЕ/л)	18
Уровень глюкозы натощак (ммоль/л)	4.90
Триглицериды (ммоль/л)	1.51
Общий холестерин (ммоль/л)	5.67
Вес (кг)	83.00
Рост (м)	1.89



## Интерпретация

Уровень SteatoScreen: 1

- Выраженный фиброз и стеатоз не диагностированы.
- Рекомендуется динамическое наблюдение за состоянием печени, а также регулярное проведение теста SteatoScreen.

### Меры предосторожности по использованию

- Соблюдение рекомендуемых Биопредиктивом условий до и во время проведения анализа является основой получения достоверных результатов.
- Тест не применяется при: остром гемолизе, остром гепатите, острых воспалительных заболеваниях, внепеченочном холестазе.
- Посоветуйтесь со специалистом при интерпретации теста в случае хронического гемолиза или синдрома Жильбера.
- Результаты теста не подтверждаются у пациентов с трансплантированной печенью.
- Будьте внимательны при интерпретации результатов в случае крайних значений какого-либо из показателей.
- При несоответствии результатов биопсии и теста обсудите ситуацию со специалистом. Причиной могут быть ошибочные результаты как теста, так и биопсии: например, ошибка биопсии в определении стадии фиброза отмечается в 33% случаев.
- ФиброТест и СтеатоТест используются при хронических гепатитах В и С, алкогольном и неалкогольном стеатозе.
- НэшТест проводится при неалкогольном стеатогепатите.
- ЭштТест проводится при алкогольном стеатогепатите.
- АктиТест проводится при хронических гепатитах В и С.