

ПАНЕЛЬ АТИТЕЛ ПРИ СКЛЕРОДЕРМИИ

ТЕСТ № 826

НСС

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

Пол:

Возраст:

ИНЗ:

Дата взятия образца: ДД.ММ.ГГГГ

Дата поступления образца: ДД.ММ.ГГГГ

Врач: ДД.ММ.ГГГГ

Дата печати результата: ДД.ММ.ГГГГ

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарии
Панель АТ при склеродермии, IgG блот	СМ КОММ			Антител к антигенам Scl-70, CENT-A, CENT-B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl 100/75, Ku, PDGFR, Ro-52 не обнаружено
CENP A	ОТРИЦАТ.		ОТРИЦАТ.	
CENP B	ОТРИЦАТ.		ОТРИЦАТ.	
RP 11	ОТРИЦАТ.		ОТРИЦАТ.	
RP 155	ОТРИЦАТ.		ОТРИЦАТ.	
Fibrillarin	ОТРИЦАТ.		ОТРИЦАТ.	
NOR 90	ОТРИЦАТ.		ОТРИЦАТ.	
Scl-70	ОТРИЦАТ.		ОТРИЦАТ.	
Th/To	ОТРИЦАТ.		ОТРИЦАТ.	
PM-Scl100	ОТРИЦАТ.		ОТРИЦАТ.	
PM-Scl 75	ОТРИЦАТ.		ОТРИЦАТ.	
Ku	ОТРИЦАТ.		ОТРИЦАТ.	
PDGFR	ОТРИЦАТ.		ОТРИЦАТ.	
Ro-52	ОТРИЦАТ.		ОТРИЦАТ.	

*Результат, выходящий за пределы референсных значений

ПАНЕЛЬ АНТИТЕЛ ПРИ СКЛЕРОДЕРМИИ

ТЕСТ № 826

НСС

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

Пол:

Возраст:

ИНЗ:

Дата взятия образца: ДД.ММ.ГГГГ

Дата поступления образца: ДД.ММ.ГГГГ

Врач: ДД.ММ.ГГГГ

Дата печати результата: ДД.ММ.ГГГГ

Исследование

Заключение

Отсутствие антител к антигенам характерным для склеродермии при исследовании методом иммуноблота значительно снижает вероятность развития тяжелой клинической формы диффузной склеродермии.

*Результат, выходящий за пределы референсных значений